



Instrucciones pre-operativos

Date of Procedure: _____

Time to arrive: _____

Location:

Texas Orthopedic Hospital
7401 S. Main St.
Houston, TX 77030
(713) 799-8600

Kirby Surgical Center
9300 Kirby Dr., Ste. 100
Houston, TX 77054
(832) 201-5157

Foundation Surgical Hospital
5410 West Loop South
Bellaire, TX 77401
(713) 314-4444

Check-in: 1st floor, Spine Center

Check-in: Front Desk

Check-in: 1st floor, Front Desk

Las INSTRUCCIONES PACIENTES:

El Tiempo de la llegada:

Su tiempo de la llegada no es necesariamente el tiempo de su procedimiento. El tiempo de llegada ha sido estimado al mejor de nuestra capacidad, pero las demoras pueden ocurrir, así que traen material de lectura u otras cosas para ocupar su tiempo le debe es requerido a esperar.

Comer & Bebiendo:

Nada comer o beber por 6 horas antes de su procedimiento inclusive dulces, las pastillas o engomar. Usted puede cepillarse los dientes, pero no tragar. Un sorbo de agua puede ser tomado con medicina necesaria la mañana de su procedimiento, pero justo bajar bastante sus píldoras.

Las medicinas:

Notifique a su médico antes que la fecha de su procedimiento si usted toma cualquiera de las medicinas siguientes: La sangre thinners (i.e. Coumadin, warfarin, Plavix, la Heparina, Lovenox, la Aspirina) píldoras Antiinflamatorias de dolor medicinas de hierbas Hacen dieta píldoras que

Las medicinas siguientes deben ser tomadas en su tiempo regularmente planificado con un sorbo de agua: Las medicinas del Corazón de medicinas de tensión (menos aspirina a menos que de otro modo instruido) Tiroides de medicinas de Toma u otras medicinas de hormona

Usted debe parar las medicinas siguientes a menos que de otro modo instruido: La aspirina 10 días antes que su procedimiento (Excedrin, aC Polvo, el Petróleo de Pez, el Alka-agua de Seltz, la Vitamina E) Coumadin 5 días antes de su procedimiento

Plavix 7 días antes de su procedimiento medicina antiinflamatoria 3 días antes de su procedimiento (Advil, Aleve, Motrin, Ibuprofen, Relafen, Mobic, Lodine) medicinas de dieta de Prescripción 1 semana antes que procedimiento Tylenol y Celebrex pueden ser continuados hasta el día del procedimiento. Ninguna medicinas del dolor deben ser tomadas el día del procedimiento

La insulina y las medicinas orales para la diabetes deben ser tomados por sus instrucciones específicas de médico. Generalmente insulina y otras medicinas para bajar su nivel de azúcar en la sangre no debe ser tomado la mañana del procedimiento. Traiga por favor todas sus medicinas al procedimiento en sus contenedores originales. No vacile en contactar su médico si usted tiene cualquier preguntas de medicina.

El vestido:

Lleve cómodo, afloja ropa fitting. Deje joyas y otros objetos de valor en casa. No lleve maquillaje ni coloró esmalte para las uñas. Si usted lleva contactos, traiga un caso para el almacenamiento y todos suministros necesarios para el cuidado.

El transporte:

Usted debe tener a una persona responsable le acompaña de la sala de posoperatorio a en casa. El fracaso para tener un paseo tendrá como resultado en casa cancelación. Usted debe tener a una persona responsable para permanecer con usted 24 horas después de su procedimiento.

Change en el estatus médico

Si hay un cambio significativo en su condición médica o si usted desarrolló cualquier signo de la infección notifica por favor nuestra oficina inmediatamente como esto puede necesitar reprogramar de su procedimiento.